

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 – 01.01.20015

Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor begrenset hva som er gjort av observasjoner. Hytteeiere og andre som har gjort observasjoner som kan utfylle denne oversikten kan gjerne ta kontakt med undertegnede slik at observasjonene blir registrert. Undertegnede kan kontaktes på telefon 90164293 eller e-mail:

rolfjorn.karlsen@fellesforbundet.no

Rabalen 31.12.2015

Rolf Jørn Karlsen

Tegnforklaringer:

H = Hekking

h = Sannsynlig hekking

o = Observervert

Lomfamilien

Storlom (H)

Hekker årvisst i bla Vangsjøen, Røyri og Kjølavatn.

Hegrefamilien

Hegre (o)

Har siden 1980-tallet blitt årvisst på Vangsjøen. Holder til der hele sommeren. Har aldri observert mer enn to individer samtidig. Dreier seg trolig kun om oversomring.

Andefamilien

Stokkand (H)

Hekker årlig bla i Vangsjøen.

Krikkand (H)

Hekker årlig bla i Vangsjøen.

Stjertand (o)

Så ett stjertandpar i Vangsjøen på våren på slutten av 1970-tallet. Eneste observasjonen jeg kjenner til.

Brunnakke (o-h)

Observeres enkelte år bla i Vangsjøen.

Toppand (H)

Sees med unger år om annet i Vangsjøen.

Bergand (h)

Observervert enkelte år i små vann i de høyereliggende deler av området, bla på fjellet mellom Rabalsmellen og Rundemellen.

Svartand (o-h)

Sett enkelte år i området.

Kvinand (H)

Vanlig hekkeart. Har holdt vedlike 11 andeholker jeg satte opp i 1975. Hekker årlig i 3-7 av disse kassene. I løpet av de siste 40 åra er det trolig produsert minst 1200 – 1500 kvinandunger i disse kassene. Det er mangel på gode rugeplasser for kvinanda da den er huleruger. Viktig bidrag å sette opp kasser. Anbefaler hytteeiere å gjøre det samme.

Siland (H)

Hekker fåtallig bla i Vangsjøen.

Laksand (H)

Hekker fåtallig. I 2006 2007 hekket den i en andeholk på fjøsveggen på setra vår på Rabalen.

Fiskeørnfamilien

Fiskeørn (o)

Har sjøl sett fiskeørn en gang i flukt over Øyangen en sommer på begynnelsen av 1980-tallet. I tillegg kjenner til kun en observasjon fra 1970-tallet hvor den ble sett da den stupte etter fisk i Vangsjøen. Siden 2008 har jeg sett den årlig fiske i Vangsjøen på forsommeren og sommeren. Hekker ikke i Vangsjøområdet, men trolig er den etablert som hekkefugl i Øystre Slidre og benytter Vangsjøen som fiskeområde.

Haukefamilien

Hønehauk (o)

4-5 observasjoner i perioden.

Spurvehauk (o)

Har gjort 5-10 observasjoner i perioden

Fjellvåk (H)

Vanlig hekkefugl i gode smånagerår. Ringmerket 5-6 kull av fjellvåk på begynnelsen av 1980-tallet.

Kongeørn (h)

3 observasjoner fram til 2011. En gang på slutten av 1970-tallet hvor tamrein var tatt av snøras ved Rundemellen, ble det sett kongeørn på reinkadaver. Siden har hytteeiere og undertegnede gjort årlige observasjoner vår, sommer og høst. Siste observasjon gjorde jeg 9. november 2014 hvor to voksne og en ungfugl var i seilflukt over en bergvegg og hvor de til slutt slo seg ned i bergveggen. Trolig etablert som hekkeart i området. Den er veldig sårbar i hekkeperioden. Viktig at vi som ferdes i dette området gir dem fred.

Myrhauk (H)

Kjenner til ett hekkefunn for 3-4 år siden. Sees i gode smånagerår senest observerte jeg den våren 2007 og forsommeren 2014.

Falkefamilien

Jaktfalk (o)

2 ganger observert et ”storfalkpar”. En gang på slutten av 1080-tallet og en gang i 2007.

Dvergfalk (H)

Hekker årlig i området.

Tårnfalk (H)

Hekker fåtallig i området.

Skogshønsfamilien

Lirype (H)

Vanlig hekkefugl.

Fjellrype (h)

Har observert fjellrype på Rundemellen.

Orrfugl (H)

Vanlig hekkefugl.

Storfugl (h)

Har ikke observert den sjøl men vet den holder til i liene mer ned mot bygda.

Tranefamilien

Trane (H)

Hekket fåtallig fram til slutten av 1990-tallet. Ett par skydde reiret våren 2007 da to fuglehunder ble sluppet løs mot traneparet ved et av reirene ved Vangsjøen. Trist å se en fuglehundeier bevisst slippe dem løs på beitende og hekkende trane. De siste 15 åra har tranebestanden tatt seg opp i området.

Lo-familien

Heilo (H)

Vanlig hekkefugl bla på Kjølafjellet.

Vipe (H)

Observerte to individer en sein påske på 1970-tallet på setervang på Rabalen. I tillegg har et par etablert seg som årlig hekkefugl siden 2009 i et myrområde ved Vangsjøen.

Snipefamilien

Brushane (o)

Observerte den en sommer på 1970-tallet ved et oppdemmet tjern ved Rabalen.

Rødstilk (H)

Hekker fåtallig i området.

Gluttsnipe (H)

Hekker fåtallig i området.

Strandsnipe (H)

Vanlig hekkefugl.

Småspove (H)

1-3 par hekker i området.

Enkeltbekkasin (H)

Vanlig hekkefugl.

Måkefamilien

Hettemåke (h)

På 1970-tallet observerte jeg den ofte i Vangsjøen. Har ikke sett den på mange år.

Fiskemåke (H)

Hekker på øyer i flere vann i området.

Makrell-/Rødnebbterne (H)

Hekker bla i Vangsjøen.

Duefamilien

Ringdue (H)

Er nå en vanlig hekkefugl i området.

Gjøkefamilien

Gjøk (H)

Vanlig hekkefugl.

Uglefamilien

Hubro (o-h)

Tre sikre observasjoner fra 1990 fram til i dag. Hørte den rope fra potensiell hekkeplass i påsken 2014. Spennende å se om den er i ferd med å etablere seg som hekkefugl i området. Hubro er veldig vår for forstyrrelser ved reirplasser.

Hornugle (H)

Hekker fåtallig i gode smågnagerår. Siste hekkefunn var på Rabalen våren 2014. To unger vokste opp.

Jordugle (H)

Sees ofte i gode smågnagerår i fluktlek over myrer og setervanger i området.

Perleugle (H)

Hekker fåtallig i gode smågnagerår. Senest i 2007 hekket den i en av andeholkene ved Vangsjøen. Gjorde hekkforsøk i perleuglekassa jeg har ved setra i 2013. Hekkingen mislyktes. Gjorde nyttforsøk i 2014. Ble fortrent til fordel for hornugleparet som holdt til i nærområdet.

Spurveugle (o)

En hytteeier i lia mot Rabalsmellen hadde en spurveugle som lagret mus i eie fuglekasse en vinter på slutten av 1990-tallet.

Haukugle (H)

Sees ofte i påsken men også på våren og sommeren. Har sett den på ved Kjølavatn, Yddin og ofte ved Vangsjøen. Første observasjon ble gjort på begynnelsen av 1980-tallet. Haukugle med unger ble observert like ved brua mellom Vangsjøen og Røyri på midten av 1990-tallet.

Spettefamilien

Vendehals (H)

Funnet hekkende i kasse av hytteeier ved Vangsjøen i 2007.

Tretåspett (H)

Så tretåspett på en av øyene i Vangsjøen på begynnelsen av 1990-tallet. Er er gang funnet hekkende av hytteeier etter dette.

Flaggspett (h)

Sees enkelte ganger i skogsområdene.

Tårnseilerfamilien

Tårnseiler (o)

Observeres årlig.

Svalefamilien

Låvesvale (H)

Årlig hekkefugl.

Taksvale (H)

Vanlig hekkefugl spesielt i sammenheng med setermiljøet i gamle løer og fjøs.

Lerkefamilien

Heipiplerke (H)

Vanlig hekkefugl.

Trepiplerke (H)

Hekkefugl i skogsområdene.

Erlefamilien

Gulerle (H)

Vanlig hekkefugl. Finner den ofte på setervanger.

Linerle (H)

Vanlig hekkefugl.

Stærfamilien

Stær (o)

Observeres årlig på næringsøk på setervanger.

Kråkefamilien

Nøtteskrike (o)

Sees på foringsbrett på vinteren.

Lavskrike (h)

Vanlig å observere i skogsområdene. Sees ofte langs stien mellom Vangsjøen Fjellstue og Røyri.

Skjære (H)

Hekker fåtallig i sammenheng med seterområder.

Kråke (H)

Vanlig hekkefugl.

Ravn (H)

Hekker fåtallig i området. På vinteren observeres ofte store flokker med ravn i seilflukt over Rabalsmellen.

Fossekalffamilien

Fossekall (H)

Fåtallig hekkefugl. 1-2 individer overvintret hvert år i bekken mellom Røyri og Vangsjøen.

Sangerfamiiien

Løvsanger (H)

Vanlig hekkefugl.

Grå fluesnapper (H)

Har gjort hekkefunn ved Vangsjøen. Hekker fåtallig i området.

Steinskvett (H)

Vanlig hekkefugl.

Rødstjert (H)

Fåtallig hekkefugl. Hekker årlig i fuglekasser jeg har satt opp.

Blåstrupe (H)

Vanlig hekkefugl. Eksempelvis har ett par årlig tilhold på oversiden av brua ved Vangsjøen Fjellstue.

Trostefamilien

Gråtrost (H)

Vanlig hekkefugl.

Ringtrost (H)

Sees ofte på setervanger om våren. Har bla årlig tilhold i steinura mellom Rabalsvann og berget på oversiden.

Svarttrost (H)

Vanlig hekkefugl i skogsområdene.

Rådvingetrost (H)

Vanlig hekkefugl.

Måltrost (H)

Hekker i skogsområdene.

Meisefamilien

Granmeis (H)

Vanlig hekkefugl. I 2013 og 2014 hekket den i ei kasse på vår setervang på Rabalen.

Kjøttmeis (H)

Vanlig hekkefugl.

Finkefamilien

Bokfink (H)

Hekker i skogsområdene.

Bjørkefink (H)

Hekker i skogsområdene.

Grønnfink (H)

Fåtallig hekkefugl.

Grønnsisik (h)

Observeres hver sommer.

Gråsisik (H)

Observeres vanlig hver sommer.

Bergirisk (h)

Hekker trolig i området. Observerer den hver vår ved setervanger på Rabalen. Har på sommeren sett de ofte ved Rabalsvann opp mot berget.

Gran/Furukorsnebb (h)

Observeres årlig. Hekker trolig i skogsområdene.

Dompap (o-h)

Har kun en observasjon fra foringsplass på setra en påske. Hytteeiere som har hytte i skogsområdene ser mye dompap på sine foringsplasser.

Buskspurvfamilien

Sivspurv (H)

Vanlig hekkefugl.

Snøspurv (o)

Ser den ofte i Påsken ved Rundemellen.